

近日発売のご案内

薬価基準未収載

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、近く発売させていただく予定であります下記の2012年6月収載予定品につきまして、ご案内申し上げます。

謹 白

■発売予定日：2012年6月

■新製品	<成分>	<先発医薬品名(会社名)>
<small>選択的セロトニン再取り込み阻害剤</small> パロキセチン錠5mg「タナベ」 ※1 パロキセチン錠10mg「タナベ」 パロキセチン錠20mg「タナベ」	パロキセチン塩酸塩水和物	パキシル錠(GSK)
<small>前立腺肥大症の排尿障害改善剤</small> タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「CH」 ※2 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「CH」	タムスロシン塩酸塩	ハルナールD錠 (アステラス)

■規格追加品	<成分>	<先発医薬品名(会社名)>
<small>抗血小板剤</small> アンギナール®錠100mg ※2	ジピリダモール	ペルサンチン錠 (日本ベーリンガー)
<small>持続型ループ利尿剤</small> ダイタリック®錠30mg ※2 (2012年7月発売予定)	アゾセミド	ダイアート錠 (三和化学)
<small>抗リウマチ剤</small> アザスルファン®腸溶錠250mg ※2 (2012年7月発売予定)	サラゾスルファピリジン	アザルフィジンEN錠 (ファイザー=参天)

■販売名変更品





<small>高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗薬)</small> アムロジピン内用ゼリー2.5mg「CH」	→	アムロジピン内用ゼリー2.5mg「タナベ」 ※1
アムロジピン内用ゼリー5mg「CH」	→	アムロジピン内用ゼリー5mg「タナベ」



各製品のお問合せ先(※1、※2)については最終ページをご覧ください。





新製品



薬効分類	日本標準商品分類番号	成分・分量	本体識別記号	包装識別記号	包装単位
	品名 規制区分	性状 貯法	剤形写真(実物大) (直径mm)(厚さmm)(重量mg)	包装写真(縮小) (縦mm)(横mm)	先発医薬品名 (会社名) 薬価
薬価基準収載医薬品コード		効能・効果		用法・用量	
包装単位		JANコード			


精神神経用剤	871179	1錠中 パロキセチン塩酸塩水和物・・・5.69mg (パロキセチンとして5mg) 白色・フィルムコーティング錠(割線入)				100錠
	選択的セロトニン再取り込み阻害剤 パロキセチン錠5mg「タナベ」  	室温保存	6.6	3.8	179	パキシル錠 (GSK) 60.50
薬価基準収載医薬品コード			用法・用量			
薬価基準未収載			うつ病・うつ状態 通常、成人には1日1回夕食後、パロキセチンとして20～40mgを経口投与する。投与は1回10～20mgより開始し、原則として1週ごとに10mg/日ずつ増量する。なお、症状により1日40mgを超えない範囲で適宜増減する。			
包装単位			パニック障害 通常、成人には1日1回夕食後、パロキセチンとして30mgを経口投与する。投与は1回10mgより開始し、原則として1週ごとに10mg/日ずつ増量する。なお、症状により1日30mgを超えない範囲で適宜増減する。			
JANコード			強迫性障害 通常、成人には1日1回夕食後、パロキセチンとして40mgを経口投与する。投与は1回20mgより開始し、原則として1週ごとに10mg/日ずつ増量する。なお、症状により1日50mgを超えない範囲で適宜増減する。			
PTP 100錠						
4987813708155						

精神神経用剤	871179	1錠中 パロキセチン塩酸塩水和物・・・11.38mg (パロキセチンとして10mg) 白色・フィルムコーティング錠	 6.6 3.8 179	 TG212 85.3 34 (116.14錠シート)	100錠 140錠 500錠 500錠バラ
	選択的セロトニン再取り込み阻害剤 パロキセチン錠10mg「タナベ」 (劇)(要処方)	室温保存			パキシル錠 (GSK) 105.60
薬価基準収載医薬品コード			効能・効果 うつ病・うつ状態 パニック障害 強迫性障害		
薬価基準未収載					
包装単位 JANコード					
PTP 100錠 4987813708162					
PTP 140錠 4987813708186					
PTP 500錠 4987813708179					
バラ 500錠 4987813708193					
			用法・用量 うつ病・うつ状態 通常、成人には1日1回夕食後、パロキセチンとして20～40mgを経口投与する。投与は1回10～20mgより開始し、原則として1週ごとに10mg/日ずつ増量する。なお、症状により1日40mgを超えない範囲で適宜増減する。 パニック障害 通常、成人には1日1回夕食後、パロキセチンとして30mgを経口投与する。投与は1回10mgより開始し、原則として1週ごとに10mg/日ずつ増量する。なお、症状により1日30mgを超えない範囲で適宜増減する。 強迫性障害 通常、成人には1日1回夕食後、パロキセチンとして40mgを経口投与する。投与は1回20mgより開始し、原則として1週ごとに10mg/日ずつ増量する。なお、症状により1日50mgを超えない範囲で適宜増減する。		

薬効分類	日本標準商品分類番号	成分・分量	本体識別記号	包装識別記号	包装単位
	品名 規制区分	性状 貯法	剤形写真(実物大) (直径mm)(厚さmm)(重量mg)	包装写真(縮小) (縦mm)(横mm)	先発医薬品名 (会社名) 薬価
薬価基準収載医薬品コード		効能・効果		用法・用量	
包装単位 JANコード					
精神神経用剤	871179	1錠中 パロキセチン塩酸塩水和物・・・22.76mg (パロキセチンとして20mg) 白色・フィルムコーティング錠			100錠 140錠 500錠 500錠バラ
	選択的セロトニン再取り込み阻害剤 パロキセチン錠20mg「タナベ」 (劇) (要処方)	室温保存	8.1 5.0 358		パキシル錠 (GSK) 184.70
薬価基準収載医薬品コード		効能・効果 うつ病・うつ状態 パニック障害 強迫性障害		用法・用量 うつ病・うつ状態 通常、成人には1日1回夕食後、パロキセチンとして20～40mgを経口投与する。投与は1回10～20mgより開始し、原則として1週ごとに10mg/日ずつ増量する。なお、症状により1日40mgを超えない範囲で適宜増減する。 パニック障害 通常、成人には1日1回夕食後、パロキセチンとして30mgを経口投与する。投与は1回10mgより開始し、原則として1週ごとに10mg/日ずつ増量する。なお、症状により1日30mgを超えない範囲で適宜増減する。 強迫性障害 通常、成人には1日1回夕食後、パロキセチンとして40mgを経口投与する。投与は1回20mgより開始し、原則として1週ごとに10mg/日ずつ増量する。なお、症状により1日50mgを超えない範囲で適宜増減する。	
薬価基準未収載					
包装単位 JANコード					
PTP 100錠	4987813708209				
PTP 140錠	4987813708223				
PTP 500錠	4987813708216				
バラ 500錠	4987813708230				

薬効分類	日本標準商品分類番号	成分・分量	本体識別記号	包装識別記号	包装単位
	品名 規制区分	性状 貯法	剤形写真(実物大) (直径mm)(厚さmm)(重量mg)	包装写真(縮小) (縦mm)(横mm)	先発医薬品名 (会社名) 薬価
薬価基準収載医薬品コード		効能・効果		用法・用量	
包装単位 JANコード					



その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	87259	1錠中 日局 タムスロシン塩酸塩 ・・・0.1mg			140錠
	前立腺肥大症の排尿障害改善剤 タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg「CH」	白色の素錠			ハルナールD錠 (アステラス) 72.20
			7.0	3.4	120
薬価基準収載医薬品コード			効能・効果		
薬価基準未収載			前立腺肥大症に伴う排尿障害		
包装単位			JANコード		
PTP 140錠			4987813708292		
			用法・用量		
			通常、成人にはタムスロシン塩酸塩として0.2mgを1日1回食後に経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。		

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	87259	1錠中 日局 タムスロシン塩酸塩 ・・・0.2mg	TG 263	TG263 128 37	140錠 560錠
	前立腺肥大症の排尿障害改善剤 タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg「CH」	白色の素錠			ハルナールD錠 (アステラス) 142.10
(要処方)		室温保存、気密容器	7.5 3.6 160		
薬価基準収載医薬品コード			効能・効果		
薬価基準未収載			前立腺肥大症に伴う排尿障害		
包装単位 JANコード					
PTP 140錠 4987813708308					
PTP 560錠 4987813708315					
			用法・用量		
			通常、成人にはタムスロシン塩酸塩として0.2mgを1日1回食後に経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。		

規格追加品

薬効分類	日本標準商品分類番号	成分・分量	本体識別記号	包装識別記号	包装単位
	品名 規制区分	性状 貯法	剤形写真(実物大) (直径mm)(厚さmm)(重量mg)	包装写真(縮小) (縦mm)(横mm)	先発医薬品名 (会社名) 薬価
薬価基準収載医薬品コード		効能・効果		用法・用量	
包装単位 JANコード					

血管 拡張 剤	872171	1錠中 日局 ジピリダモール・・・ 100mg							100錠
	抗血小板剤 アンギナール®錠100mg	淡赤色のフィルムコー ティング錠	7.1 3.7 125			TG118 92 34			ベルサンチン錠 (日本ベーリン ガー) 24.00
	(要処方)	室温保存、気密容器							
	薬価基準収載医薬品コード		効能・効果			用法・用量			
	薬価基準未収載		1. ワーファリンとの併用による心臓弁置換 術後の血栓・塞栓の抑制			1. 血栓・塞栓の抑制の場合 ジピリダモールとして、通常成人1 日300～400mgを3～4回に分割 経口投与する。なお、年齢、症状に より適宜増減する。			
	包装単位 JANコード		2. つぎの疾患における尿蛋白減少：ステロ イドに抵抗性を示すネフローゼ症候群			2. 尿蛋白減少を目的とする場合 ジピリダモールとして、通常成人1 日300mgを3回に分割経口投与する 。なお、年齢、症状により適宜増減す る。 投薬開始後、4週間を目標として投 薬し、尿蛋白量の測定を行い、以後 の投薬継続の可否を検討する。尿蛋 白量の減少が認められない場合は、 投薬を中止するなど適切な処置をと ること。尿蛋白量の減少が認められ 投薬継続が必要な場合は、以後定期 的に尿蛋白量を測定しながら投薬す ること。			
PTP 100錠 4987813708490									

利尿剤	872139	1錠中 アゾセמיד・・・30mg					100錠
	持続型ループ利尿剤 ダイタリック®錠30mg (2012年7月発売予定)	白色割線入り円形の フィルムコーティング錠	6.1	3.0	95		ダイアート錠 (三和化学) 23.60
	(要処方)	室温遮光保存					
薬価基準収載医薬品コード			効能・効果		用法・用量		
薬価基準未収載			心性浮腫（うっ血性心不全）、腎性浮腫、肝性浮腫		通常成人1日1回2錠（アゾセמידとして60mg）を経口投与する。 なお、年齢・症状により適宜増減する。		
包装単位 JANコード							
PTP 100錠 4987813708001							



薬効分類	日本標準商品分類番号	成分・分量	本体識別記号	包装識別記号	包装単位
	品名 規制区分	性状 貯法	剤形写真(実物大) (直径mm)(厚さmm)(重量mg)	包装写真(縮小) (縦mm)(横mm)	先発医薬品名 (会社名) 薬価
薬価基準収載医薬品コード		効能・効果		用法・用量	
包装単位 JANコード					

サル フ ア 剤	876219	1錠中 サラゾスルファピリジン ・・・250mg	<div>CH T</div> <div></div> <div>9.7 5.0 340.5</div>	<div>CH T</div> <div>94 39</div> <div></div>	100錠		
	抗リウマチ剤 アザスルファン®腸溶錠 250mg (2012年7月発売予定)	黄色～黄褐色円形の腸 溶性フィルムコーティン グ錠			アザルフィジン EN錠 (ファイザー=参天) 40.40		
	(要処方)	室温保存					
	薬価基準収載医薬品コード				効能・効果 関節リウマチ	用法・用量 本剤は、消炎鎮痛剤などで十分な効果が 得られない場合に使用すること。通常、 サラゾスルファピリジンとして成人1日 投与量 1 gを朝食及び夕食後の2回に分割 経口投与する。	
	薬価基準未収載						
	包装単位	JANコード					
PTP 100錠	4987813707455						

販売名変更品

旧販売名品の経過措置期限は未定です。

薬効分類	日本標準商品分類番号	成分・分量	本体識別記号	包装識別記号	包装単位
	品名 規制区分	性状 貯法	剤形写真(縮小)	包装写真(縮小) (縦mm) (横mm)	先発医薬品名 (会社名) 薬価
薬価基準収載医薬品コード		効能・効果		用法・用量	
包装単位		JANコード			

血管拡張剤	872171	1包(本品1g)中 日局 アムロジピンベシル酸塩・・・3.47mg (アムロジピンとして2.5mg)			100包			
	高血圧症・狭心症治療剤 (持続性Ca拮抗薬) アムロジピン内用ゼリー 2.5mg「タナベ」	白色～淡黄色のゼリー状			ノルバスク錠 (ファイザー) 32.10			
	Ⓔ 劇 Ⓔ 要処方	室温保存、気密容器			アムロジピン錠 (大日本住友) 31.10			
	薬価基準収載医薬品コード				効能・効果 高血圧症、狭心症		用法・用量 高血圧症 通常、成人にはアムロジピンとして2.5～5mgを1日1回経口投与する。 なお、症状に応じ適宜増減するが、効果不十分な場合には1日1回10mgまで増量することができる。 狭心症 通常、成人にはアムロジピンとして5mgを1日1回経口投与する。なお、症状に応じ適宜増減する。	
	薬価基準未収載							
	包装単位	JANコード						
100包	4987813708360							

血管 拡張 剤	872171	1包（本品2g）中 日局 アムロジピンベシ ル酸塩・・・6.93mg （アムロジピンとして5 mg） 白色～淡黄色の ゼリー状 室温保存、気密容器		TG804 71 136  5連包/シート	100包 ノルバスク錠 （ファイザー） 58.80 ----- アムロジン錠 （大日本住友） 57.50	
	高血圧症・狭心症治療剤 （持続性Ca拮抗薬） アムロジピン内用ゼリー 5mg「タナベ」					
	劇要処方					
	薬価基準収載医薬品コード			効能・効果 高血圧症、狭心症		用法・用量 高血圧症 通常、成人にはアムロジピンとして 2.5～5mgを1日1回経口投与する。 なお、症状に応じ適宜増減するが、効 果不十分な場合には1日1回10mgま で増量することができる。 狭心症 通常、成人にはアムロジピンとして 5mgを1日1回経口投与する。なお、 症状に応じ適宜増減する。
	薬価基準未収載					
包装単位	JANコード					
100包	4987813708377					

バーコード一覧

品 名	包 装	JANコード	GS1-RSSコード	
			調剤包装単位	販売包装単位
パロキセチン錠5mg 「タナベ」	100錠 (10錠×10)PTP	 4 987813 708155	 (01)04987813708384	 (01)14987813708152
パロキセチン錠10mg 「タナベ」	100錠 (10錠×10)PTP	 4 987813 708162	 (01)04987813708391	 (01)14987813708169
パロキセチン錠10mg 「タナベ」	140錠 (14錠×10)PTP	 4 987813 708186	 (01)04987813708407	 (01)14987813708183
パロキセチン錠10mg 「タナベ」	500錠 (10錠×50)PTP	 4 987813 708179	 (01)04987813708391	 (01)14987813708176
パロキセチン錠10mg 「タナベ」	500錠 バラ	 4 987813 708193	 (01)04987813708414	 (01)14987813708190
パロキセチン錠20mg 「タナベ」	100錠 (10錠×10)PTP	 4 987813 708209	 (01)04987813708421	 (01)14987813708206
パロキセチン錠20mg 「タナベ」	140錠 (14錠×10)PTP	 4 987813 708223	 (01)04987813708438	 (01)14987813708220
パロキセチン錠20mg 「タナベ」	500錠 (10錠×50)PTP	 4 987813 708216	 (01)04987813708421	 (01)14987813708213
パロキセチン錠20mg 「タナベ」	500錠 バラ	 4 987813 708230	 (01)04987813708445	 (01)14987813708237
タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg「CH」	140錠 (14錠×10)PTP	 4 987813 708292	 (01)04987813708452	 (01)14987813708299
タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg「CH」	140錠 (14錠×10)PTP	 4 987813 708308	 (01)04987813708469	 (01)14987813708305
タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg「CH」	560錠 (14錠×40)PTP	 4 987813 708315	 (01)04987813708469	 (01)14987813708312
アンギナール [®] 錠100mg	100錠 (10錠×10)PTP	 4 987813 708490	 (01)04987813708513	 (01)14987813708497

バーコード一覧

品 名	包 装	JANコード	GS1-RSSコード	
			調剤包装単位	販売包装単位
ダイタリック [®] 錠30mg (2012年7月発売予定)	100錠 (10錠×10)PTP	 4 987813 708001	 (01)04987813708070	 (01)14987813708008
アザスルファン [®] 腸溶錠 250mg (2012年7月発売予定)	100錠 (10錠×10)PTP	 4 987813 707455	 (01)04987813707554	 (01)14987813707452
アムロジピン内用ゼリー 2.5mg「タナベ」	100包	 4 987813 708360	 (01)04987813708476	 (01)14987813708367
アムロジピン内用ゼリー 5mg「タナベ」	100包	 4 987813 708377	 (01)04987813708483	 (01)14987813708374

個装箱サイズ／体積一覧

品 名	包 装	個装箱サイズ (mm)	体積 (mL)
パロキセチン錠5mg「タナベ」	100錠 (10錠×10)PTP	45×105×35	165
パロキセチン錠10mg「タナベ」	100錠 (10錠×10)PTP	45×105×35	165
パロキセチン錠10mg「タナベ」	140錠 (14錠×10)PTP	45×135×35	213
パロキセチン錠10mg「タナベ」	500錠 (10錠×50)PTP	45×145×100	653
パロキセチン錠10mg「タナベ」	500錠 バラ	50×51×87	222
パロキセチン錠20mg「タナベ」	100錠 (10錠×10)PTP	55×120×45	297
パロキセチン錠20mg「タナベ」	140錠 (14錠×10)PTP	50×135×45	304
パロキセチン錠20mg「タナベ」	500錠 (10錠×50)PTP	55×180×115	1139
パロキセチン錠20mg「タナベ」	500錠 バラ	61×62×106	401
タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「CH」	140錠 (14錠×10)PTP	48×159×35	267
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「CH」	140錠 (14錠×10)PTP	48×159×35	267
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「CH」	560錠 (14錠×40)PTP	117×155×51	925
アンギナール [®] 錠100mg	100錠 (10錠×10)PTP	58×115×45	300
ダイタリック [®] 錠30mg (2012年7月発売予定)	100錠 (10錠×10)PTP	50×121×36	218
アザスルファン [®] 腸溶錠250mg (2012年7月発売予定)	100錠 (10錠×10)PTP	59×120×41	290
アムロジピン内用ゼリー2.5mg「タナベ」	100包	50×139×67	466
アムロジピン内用ゼリー5mg「タナベ」	100包	60×139×79	659

製品に関するお問合せ先 **受付時間 9:00～17:30**（土、日、祝日、その他弊社休業日を除く）

田辺三菱製薬※1

田辺三菱製薬株式会社
くすり相談センター
電話 0120-507-319

長生堂製薬※2

<文献請求、副作用、学術情報に関するお問合せ>
長生堂製薬株式会社 安全管理本部
医薬情報部
電話 0120-965-200

<左記以外に関するお問合せ>
長生堂製薬株式会社
薬事管理課
電話 0120-958-500

田辺製薬販売株式会社 ホームページアドレス
<http://www.tanabe.co.jp/>

田辺製薬販売

ウェブ検索



田辺製薬販売株式会社
大阪市中央区北浜2-6-18

 **田辺三菱製薬グループ**