― 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。―

「使用上の注意」改訂のお知らせ

平成２１年６月

販売　田辺製薬販売株式会社

製造販売元　長生堂製薬株式会社
徳島市国府町府中92番地

経口抗真菌剤

処方せん医薬品

イデノラートカプセル５０mg

（イトラコナゾール製剤）

謹啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　この度、弊社商品イデノラートカプセル５０mg につきまして「使用上の注意」を改訂致しましたので、ご案内申し上げます。
つきましては、今後は下記内容に充分ご留意頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。
　今後とも、御愛顧、御指導を賜りますよう、何卒、よろしくお願い申し上げます。

敬白

記

１．改訂内容（新旧比較）

「使用上の注意」改訂後

３．相互作用

２）**併用注意（併用に注意すること）**

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
（省略）		
併用により、相互の血中濃度に影響を及ぼすことがあるので、併用する場合には、必要に応じて本剤又は下記の薬剤の投与量を調節するなど用量に注意すること。		
インジナビル	（省略）	（省略）
ダルナビル	（省略）	（省略）
カルバマゼピン エトラビリン	本剤の血中濃度が低下することがある。また、これらの薬剤の血中濃度が上昇する可能性がある。	これらの薬剤の肝薬物代謝酵素誘導により、本剤の肝代謝が促進される。また、本剤のＣＹＰ3A4に対する阻害作用によりこれらの薬剤の代謝が阻害される。
（省略）		

「使用上の注意」改訂前

３．相互作用

２）**併用注意（併用に注意すること）**

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
（省略）		
併用により、相互の血中濃度に影響を及ぼすことがあるので、併用する場合には、必要に応じて本剤又は下記の薬剤の投与量を調節するなど用量に注意すること。		
インジナビル	（省略）	（省略）
ダルナビル	（省略）	（省略）
カルバマゼピン	本剤の血中濃度が低下することがある。また、カルバマゼピンの血中濃度が上昇する可能性がある。	カルバマゼピンの肝薬物代謝酵素誘導により、本剤の肝代謝が促進される。また、本剤のＣＹＰ3A4に対する阻害作用によりカルバマゼピンの代謝が阻害される。
（省略）		

＿＿＿部：追加改訂箇所

（うらにつづく）

２．改訂理由
関連会社内で自主改訂致しました。（＿＿部）
・「３．相互作用」の「２）併用注意」の「カルバマゼピン」に「エトラビリン」を追加致しました。

尚、上記については、ＤＳＵ№１８０（６月中旬発行予定）に掲載されます。

詳細につきましては、２００９年６月版の新添付文書をご参照頂きますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

＜お問い合わせ先＞

文献請求，副作用，学術情報に関するお問い合わせ
長生堂製薬株式会社　安全管理本部　医薬情報部
電話　０１２０−９６５−２００
上記以外に関するお問い合わせ
長生堂製薬株式会社　薬事管理課
電話　０１２０−９５８−５００

医薬品添付文書改訂情報は「医薬品医療機器情報提供ホームページ」（http://www.info.pmda.go.jp/）に最新添付文書並びに医薬品安全対策情報（ＤＳＵ）が掲載されます。