



患者さま向け文書変更のお知らせ

経皮吸収型・心疾患治療剤

ジドレン[®]テープ27mg

ニトログリセリン経皮吸収型製剤

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、「ジドレンテープ27mg」の患者さま向け文書を下記のとおり変更いたしますので、ご案内申し上げます。

謹 白

I. 該当品

ジドレンテープ27mg 140枚（1枚×140）

II. 変更ロット及び出荷時期

最終ロット(旧)	初回ロット(新)	出荷時期 ^{注)}
WF0272	WF0281	2010 年 3 月下旬

注) 特約店へのお荷予定時期を表します。

変更品がお手許に届く日時にズレを生じることがあるかと存じますが、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

III. 変更内容

- 変更箇所：
- 販売名を変更します。 ジドレンテープ → ジドレンテープ27mg
 - AEDの図を追記します。
 - 注意書きに「薬を貼っているときには」の文言を追記します。

詳細は裏面の「患者さま向け文書」(見本)をご参照願います。

(裏面へ続く)

■患者さま向け文書(見本)

変更前

患者さんへ	
ジドレンテープ (DYDRENE TAPE) の使い方 貼る場所 医師又は薬剤師の指示に従って胸、腰、上腕のいずれかに貼ってください。 貼る場所が汗・脂等でぬれている時は、よく拭きとってから使用してください。 * 胸 腰 上腕 * 胸に貼る場合は裏面の注意をお読み下さい。 ■ 薬を貼る場所 貼り方 ① ② ③ ① 四角の透明シールにスリットを入れてありますので、それを上にして二つに折ってください。 ② シールの一方をはがして、テープの粘着面を皮膚に貼り付けてください。 ③ もう一方のシールも同様にはがし、皮膚に貼ってください。(テープにしわが寄らないように十分注意して貼ってください。) 裏面もご覧ください	注 意 ● 胸に貼る場合の注意 図は緊急の救命処置に必要な自動体外式除細動器(AED)の電極パッドの貼付部位です。妨げにならないようにご注意下さい。 [AEDの図] AEDの電極パッドの貼付部位は、図の様に「右鎖骨すぐ下」と「左脇下の肋骨最下部」の位置の2箇所になります。 ● 傷口、発赤、発疹、かぶれ等のある場所及び胸毛の部分には貼らないで下さい。 ● 新しい薬に貼り替えるときは、前回と異なる場所に貼ってください。 ● 勃起不全治療剤バイアグラ錠、レビトラ錠などは絶対に服用しないでください。 ● 小児の手の届かないところに保管してください。 ● ご使用になるまでは、開封しないで、高温を避けて保管してください。 表面もご覧ください C-2

変更後

患者さんへ	
ジドレンテープ[®]27mg (DYDRENE TAPE 27mg) の使い方 貼る場所 医師又は薬剤師の指示に従って胸、腰、上腕のいずれかに貼ってください。 貼る場所が汗・脂等でぬれている時は、よく拭きとってから使用してください。 * 胸 腰 上腕 * 胸に貼る場合は裏面の注意をお読み下さい。 ■ 薬を貼る場所 貼り方 ① ② ③ ① 四角の透明シールにスリットを入れてありますので、それを上にして二つに折ってください。 ② シールの一方をはがして、テープの粘着面を皮膚に貼り付けてください。 ③ もう一方のシールも同様にはがし、皮膚に貼ってください。(テープにしわが寄らないように十分注意して貼ってください。) 裏面もご覧ください	注 意 ● 胸に貼る場合の注意 図は緊急の救命処置に必要な自動体外式除細動器(AED)の電極パッドの貼付部位です。妨げにならないようにご注意下さい。 AED AEDの電極パッドの貼付部位は、図の様に「右鎖骨すぐ下」と「左脇下の肋骨最下部」の位置の2箇所になります。 ● 傷口、発赤、発疹、かぶれ等のある場所及び胸毛の部分には貼らないで下さい。 ● 新しい薬に貼り替えるときは、前回と異なる場所に貼ってください。 ● <u>薬を貼っているときには</u>勃起不全治療剤バイアグラ錠、レビトラ錠などは絶対に服用しないでください。 ● 小児の手の届かないところに保管してください。 ● ご使用になるまでは、開封しないで、高温を避けて保管してください。 表面もご覧ください C-3



販売
田辺製薬販売株式会社
大阪市中央区北浜2-6-18
<http://www.tanabe.co.jp/>

2DY--302A-
2010年2月作成