リライアブル ジェネリック
田辺製薬販売®
「リライアブルジェネリック　田辺製薬販売」は登録商標(第524391)です

近日発売のご案内

薬価基準未収載

謹啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
このたび、近く発売させていただく予定であります下記の2011年5月収載予定品につきまして、ご案内申し上げます。

謹　白

■発売予定日：2011年5月上旬

■新製品	<成分>	<先発医薬品名(会社名)>
インスリン抵抗性改善剤−2型糖尿病治療剤− ピオグリタゾン錠15mg「タナベ」　※1 ピオグリタゾン錠30mg「タナベ」	ピオグリタゾン塩酸塩	アクトス(武田)
骨粗鬆症治療剤 リセドロン酸Na塩錠2.5mg「タナベ」　※1	リセドロン酸ナトリウム水和物	ベネット(武田) アクトネル (味の素=エーザイ)

■規格追加品	<成分>	<先発医薬品名(会社名)>
代謝性強心剤 ソラネキノン®カプセル5mg　※2	ユビデカレノン	ノイキノン(エーザイ)
尿失禁・頻尿治療剤 ビフォルベリン®錠20mg　※2	プロピベリン塩酸塩	バップフォー (大鵬薬品)
Ca拮抗剤 ジルチアゼム塩酸塩錠60mg「CH」　※2	ジルチアゼム塩酸塩	ヘルベッサー(田辺三菱)
血圧降下剤 カルメゾシン®錠0.5mg　※2 カルメゾシン®錠4mg	ドキサゾシンメシル酸塩	カルデナリン(ファイザー)
抗精神病剤 リスペリドン錠3mg「CH」　※2	リスペリドン	リスパダール(ヤンセン)

■販売名変更品

小児用解熱鎮痛剤

アニルーメ坐剤小児用50mg	→	アセトアミノフェン坐剤小児用50mg「タナベ」	※1
アニルーメ坐剤小児用100mg	→	アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「タナベ」	※1
アニルーメS坐剤200	→	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「タナベ」	※1

各製品のお問合せ先(※1、※2)については最終ページをご覧ください。

田辺製薬販売株式会社

薬効分類	日本標準商品分類番号 品　　名 規制区分	成分・分量 性　状 貯　法	本体識別記号 剤形写真(実物大) (直径mm)(厚さmm)(重量mg)	包装識別記号 包装写真(縮小) (縦mm)　(横mm)	包装単位 先発医薬品名 (会社名) 薬　価
薬価基準収載医薬品コード 包装単位　JANコード		効能・効果		用法・用量	

糖尿病用剤	873969 インスリン抵抗性改善剤 —2型糖尿病治療剤— **ピオグリタゾン錠15mg「タナベ」** (要処方)	1錠中　日局 ピオグリタゾン塩酸塩…16.53mg(ピオグリタゾンとして15mg) 白色～帯黄白色 割線入り素錠 室温保存、気密容器	TG 60 7.0　2.4　120	TG60 85.3(116：14錠シート) 34 	100錠 140錠 500錠 500錠バラ アクトス(武田) 84.60

薬価基準収載医薬品コード	効能・効果	用法・用量
薬価基準未収載 包装単位　JANコード PTP　100錠　4987813706342 PTP　140錠　4987813706359 PTP　500錠　4987813706366 バラ　500錠　4987813706373	**2型糖尿病** ただし、下記のいずれかの治療で十分な効果が得られずインスリン抵抗性が推定される場合に限る。 1．①食事療法、運動療法のみ ②食事療法、運動療法に加えてスルホニルウレア剤を使用 ③食事療法、運動療法に加えてα-グルコシダーゼ阻害剤を使用 ④食事療法、運動療法に加えてビグアナイド系薬剤を使用 2．食事療法、運動療法に加えてインスリン製剤を使用	**用法・用量** **1．食事療法、運動療法のみの場合及び食事療法、運動療法に加えてスルホニルウレア剤又はα-グルコシダーゼ阻害剤若しくはビグアナイド系薬剤を使用する場合** 通常、成人にはピオグリタゾンとして15～30mgを1日1回朝食前又は朝食後に経口投与する。なお、性別、年齢、症状により適宜増減するが、45mgを上限とする。 **2．食事療法、運動療法に加えてインスリン製剤を使用する場合** 通常、成人にはピオグリタゾンとして15mgを1日1回朝食前又は朝食後に経口投与する。なお、性別、年齢、症状により適宜増減するが、30mgを上限とする。

糖尿病用剤	873969 インスリン抵抗性改善剤 —2型糖尿病治療剤— **ピオグリタゾン錠30mg「タナベ」** (要処方)	1錠中　日局 ピオグリタゾン塩酸塩…33.06mg(ピオグリタゾンとして30mg) 白色～帯黄白色 割線入り素錠 室温保存、気密容器	TG 61 7.0　2.5　120	TG61 85.3(116：14錠シート) 34 	100錠 140錠 500錠 500錠バラ アクトス(武田) 158.00

薬価基準収載医薬品コード	効能・効果	用法・用量
薬価基準未収載 包装単位　JANコード PTP　100錠　4987813706403 PTP　140錠　4987813706410 PTP　500錠　4987813706427 バラ　500錠　4987813706434	**2型糖尿病** ただし、下記のいずれかの治療で十分な効果が得られずインスリン抵抗性が推定される場合に限る。 1．①食事療法、運動療法のみ ②食事療法、運動療法に加えてスルホニルウレア剤を使用 ③食事療法、運動療法に加えてα-グルコシダーゼ阻害剤を使用 ④食事療法、運動療法に加えてビグアナイド系薬剤を使用 2．食事療法、運動療法に加えてインスリン製剤を使用	**用法・用量** **1．食事療法、運動療法のみの場合及び食事療法、運動療法に加えてスルホニルウレア剤又はα-グルコシダーゼ阻害剤若しくはビグアナイド系薬剤を使用する場合** 通常、成人にはピオグリタゾンとして15～30mgを1日1回朝食前又は朝食後に経口投与する。なお、性別、年齢、症状により適宜増減するが、45mgを上限とする。 **2．食事療法、運動療法に加えてインスリン製剤を使用する場合** 通常、成人にはピオグリタゾンとして15mgを1日1回朝食前又は朝食後に経口投与する。なお、性別、年齢、症状により適宜増減するが、30mgを上限とする。

薬効分類	日本標準商品分類番号 品　　名 規制区分	成分・分量 性　状 貯　法	本体識別記号 剤形写真(実物大) (直径mm)(厚さmm)(重量mg)	包装識別記号 包装写真(縮小) (縦mm)　(横mm)	包装単位 先発医薬品名 (会社名) 薬　価
薬価基準収載医薬品コード 包装単位　JANコード		効能・効果		用法・用量	
他に分類されない代謝性医薬品	873999 骨粗鬆症治療剤 **リセドロン酸Na塩錠2.5mg「タナベ」** 劇 要処方	1錠中　リセドロン酸ナトリウム水和物…2.87mg (リセドロン酸ナトリウムとして2.5mg) 白色～帯黄白色フィルムコーティング錠 室温保存	TG 16 6.6　3.3　114	TG16 83(113：14錠シート) 31 	100錠 140錠 ベネット(武田) アクトネル(味の素=エーザイ) 126.20
薬価基準収載医薬品コード 薬価基準未収載 包装単位　JANコード PTP　100錠　4987813706281 PTP　140錠　4987813706298		効能・効果 骨粗鬆症		用法・用量 通常、成人にはリセドロン酸ナトリウムとして2.5mgを1日1回、起床時に十分量(約180mL)の水とともに経口投与する。 なお、服用後少なくとも30分は横にならず、水以外の飲食並びに他の薬剤の経口摂取も避けること。	
強心剤	872119 代謝性強心剤 **ソラネキノン®カプセル5mg**	1カプセル中 ユビデカレノン…5mg 頭部橙色不透明、胴部淡黄色不透明硬カプセル 室温･遮光保存、気密容器	ch-SLC 4号カプセル　170	ch-SLC 92　49 イラスト 	100カプセル ノイキノン(エーザイ) 14.70
薬価基準収載医薬品コード 薬価基準未収載 包装単位　JANコード PTP　100カプセル　4987813706465		効能・効果 基礎治療施行中の軽度及び中等度のうっ血性心不全症状		用法・用量 ユビデカレノンとして、通常成人は1回10mgを1日3回食後に経口投与する。	

薬効分類	日本標準商品分類番号 品　　名 規制区分	成分・分量 性　状 貯　法	本体識別記号 剤形外形図 (直径mm)(厚さmm)(重量mg)	包装識別記号 包装イラスト (縦mm)　(横mm)	包装単位 先発医薬品名 (会社名) 薬　価
薬価基準収載医薬品コード 包装単位　JANコード		効能・効果		用法・用量	

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	87259 尿失禁・頻尿治療剤 **ビフォルベリン®錠20mg** 要処方	1錠中　プロピベリン塩酸塩…20mg 白色 フィルムコーティング錠 室温保存、気密容器	CH 115 外形図 CH 115　20 7.1　3.1　125	CH 115 85.3　34 イラスト 	100錠 バップフォー (大鵬薬品) 143.50

薬価基準収載医薬品コード 薬価基準未収載 包装単位　JANコード PTP　100錠　4987813706472	**効能・効果** ・下記疾患又は状態における頻尿、尿失禁 神経因性膀胱、神経性頻尿、不安定膀胱、膀胱刺激状態(慢性膀胱炎、慢性前立腺炎) ・過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁	**用法・用量** 通常、成人にはプロピベリン塩酸塩として20mgを1日1回食後経口投与する。年齢、症状により適宜増減するが、効果不十分の場合は、20mgを1日2回まで増量できる。

血管拡張剤	872171 Ca拮抗剤 **ジルチアゼム塩酸塩錠60mg「CH」** 要処方	1錠中 ジルチアゼム塩酸塩…60mg 白色 徐放性素錠 室温保存	CH 324 外形図 CH 324 8.0　3.6　185	CH 324 94　37 イラスト 	100錠 ヘルベッサー (田辺三菱) 25.10

薬価基準収載医薬品コード 薬価基準未収載 包装単位　JANコード PTP　100錠　4987813706489	**効能・効果** ○狭心症、異型狭心症 ○本態性高血圧症（軽症～中等症）	**用法・用量** **○狭心症、異型狭心症** 通常、成人にはジルチアゼム塩酸塩として1回30mgを1日3回経口投与する。効果不十分な場合には、1回60mgを1日3回まで増量することができる。 **○本態性高血圧症（軽症～中等症）** 通常、成人にはジルチアゼム塩酸塩として1回30～60mgを1日3回経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。

薬効分類	日本標準商品分類番号 品　　名 規制区分	成分・分量 性　状 貯　法	本体識別記号 剤形外形図 (直径mm)(厚さmm)(重量mg)	包装識別記号 包装イラスト (縦mm)　(横mm)	包装単位 先発医薬品名 (会社名) 薬　価
薬価基準収載医薬品コード 包装単位　JANコード		効能・効果		用法・用量	

血圧降下剤	872149 血圧降下剤 **カルメゾシン®錠0.5mg** (要処方)	1錠中　日局 ドキサゾシンメシル酸塩…0.607mg (ドキサゾシンとして0.5mg) 白色 素錠 室温保存･密閉容器	CH 126 外形図 6.1　2.7　90	CH 126 85.3　34 イラスト 	100錠 カルデナリン (ファイザー) 21.80

薬価基準収載医薬品コード 薬価基準未収載 包装単位　JANコード PTP　100錠　4987813706496	**効能・効果** 高血圧症 褐色細胞腫による高血圧症	**用法・用量** 通常、成人にはドキサゾシンとして１日１回0.5mgより投与を始め、効果が不十分な場合は１～２週間の間隔をおいて１～4mgに漸増し、１日１回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、１日最高投与量は8mgまでとする。 ただし、褐色細胞腫による高血圧症に対しては１日最高投与量を16mgまでとする。

血圧降下剤	872149 血圧降下剤 **カルメゾシン®錠4mg** (要処方)	1錠中　日局 ドキサゾシンメシル酸塩…4.852mg (ドキサゾシンとして4mg) 白色 割線入り素錠 室温保存･密閉容器	CH 127 外形図  8.1　3.1　200	CH 127 85.3　34 イラスト 	100錠 カルデナリン (ファイザー) 122.90

薬価基準収載医薬品コード 薬価基準未収載 包装単位　JANコード PTP　100錠　4987813706502	**効能・効果** 高血圧症 褐色細胞腫による高血圧症	**用法・用量** 通常、成人にはドキサゾシンとして１日１回0.5mgより投与を始め、効果が不十分な場合は１～２週間の間隔をおいて１～4mgに漸増し、１日１回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、１日最高投与量は8mgまでとする。 ただし、褐色細胞腫による高血圧症に対しては１日最高投与量を16mgまでとする。

薬効分類	日本標準商品分類番号 品　　名 規制区分	成分・分量 性　状 貯　法	本体識別記号 剤形外形図 (直径mm)(厚さmm)(重量mg)	包装識別記号 包装イラスト (縦mm)　(横mm)	包装単位 先発医薬品名 (会社名) 薬　価
薬価基準収載医薬品コード 包装単位　JANコード		効能・効果		用法・用量	
精神神経用剤	871179 抗精神病剤 **リスペリドン錠3mg「CH」** 劇 要処方	1錠中　リスペリドン…3mg 白色 フィルムコーティング錠 室温保存・気密容器(湿気を避けて保存すること。)	外形図 CH 189 CH 189　3 8.1　4.0　200	イラスト CH 189 83　31	100錠 リスパダール (ヤンセン) 98.50
薬価基準収載医薬品コード 薬価基準未収載 包装単位　JANコード PTP　100錠　4987813706519		**効能・効果** 統合失調症		**用法・用量** 通常、成人にはリスペリドンとして１回1mg １日2回より始め、徐々に増量する。維持量は通常１日2～6mgを原則として、１日２回に分けて経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。但し、１日量は12mgをこえないこと。	

販売名変更品　　旧販売名品の経過措置期限は未定です。

薬効分類	日本標準商品分類番号 品　名 規制区分	成分・分量 性　状 貯　法	本体識別記号 剤形写真（実物大） （直径mm）（厚さmm）（重量mg）	包装識別記号 包装イラスト （縦mm）　（横mm）	包装単位 先発医薬品名（会社名） 薬　価
薬価基準収載医薬品コード 包装単位　JANコード		効能・効果		用法・用量	
解熱鎮痛消炎剤	871141 小児用解熱鎮痛剤 **アセトアミノフェン坐剤小児用50mg「タナベ」**	1個中　日局 アセトアミノフェン…50mg 白色～淡黄色 紡すい形坐剤 室温保存（1～30℃）	 全長 20　700	TG862 54　85 イラスト  5個／シート	100個 アルピニー（久光） アンヒバ（アボット） カロナール（昭和薬化） 19.50
薬価基準収載医薬品コード 薬価基準未収載 包装単位　JANコード 100個　4987813706526		**効能・効果** 小児科領域における解熱・鎮痛		**用法・用量** 通常、乳児、幼児及び小児にはアセトアミノフェンとして、体重1kgあたり１回10～15mgを直腸内に挿入する。投与間隔は4～6時間以上とし、１日総量として60mg／kgを限度とする。 なお、年齢、症状により適宜増減する。 ただし、成人の用量を超えない。	

解熱鎮痛消炎剤	871141 小児用解熱鎮痛剤 **アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「タナベ」**	1個中　日局 アセトアミノフェン…100mg 乳白色 紡すい形坐剤 室温保存（1～30℃）	 全長 25　980	TG863 54　86 イラスト  5個／シート	100個 アルピニー（久光=三和化学） アンヒバ（アボット） カロナール（昭和薬化=和光堂） 20.10
薬価基準収載医薬品コード 薬価基準未収載 包装単位　JANコード 100個　4987813706533		**効能・効果** 小児科領域における解熱・鎮痛		**用法・用量** 通常、乳児、幼児及び小児にはアセトアミノフェンとして、体重1kgあたり１回10～15mgを直腸内に挿入する。投与間隔は4～6時間以上とし、１日総量として60mg／kgを限度とする。 なお、年齢、症状により適宜増減する。 ただし、成人の用量を超えない。	

薬効分類	日本標準商品分類番号 品　　名 規制区分	成分・分量 性　状 貯　法	本体識別記号 剤形写真（実物大） （直径mm）（厚さmm）（重量mg）	包装識別記号 包装イラスト （縦mm）　（横mm）	包装単位 先発医薬品名（会社名） 薬　価
薬価基準収載医薬品コード 包装単位　JANコード		効能・効果		用法・用量	
解熱鎮痛消炎剤	871141 小児用解熱鎮痛剤 **アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「タナベ」**	1個中　日局 アセトアミノフェン…200mg 乳白色 紡すい形坐剤 室温保存（1～30℃）、気密容器	 全長 26　1300	TG864 54　86 イラスト  5個／シート	100個 アルピニー（久光） アンヒバ（アボット） カロナール（昭和薬化＝和光堂） 32.30
薬価基準収載医薬品コード 薬価基準未収載 包装単位　JANコード 100個　4987813706540		**効能・効果** 小児科領域における解熱・鎮痛		**用法・用量** 通常、乳児、幼児及び小児にはアセトアミノフェンとして、体重1kgあたり１回10～15mgを直腸内に挿入する。投与間隔は4～6時間以上とし、１日総量として60mg／kgを限度とする。 なお、年齢、症状により適宜増減する。 ただし、成人の用量を超えない。	

バーコード一覧

品　名	包　装	JANコード	GS1-RSSコード	
			調剤包装単位	販売包装単位
ピオグリタゾン錠15mg「タナベ」	100錠 (10錠×10)PTP	4 987813 706342	(01)04987813750772	(01)14987813706349
ピオグリタゾン錠15mg「タナベ」	140錠 (14錠×10)PTP	4 987813 706359	(01)04987813750819	(01)14987813706356
ピオグリタゾン錠15mg「タナベ」	500錠 (10錠×50)PTP	4 987813 706366	(01)04987813750772	(01)14987813706363
ピオグリタゾン錠15mg「タナベ」	500錠　バラ	4 987813 706373	(01)04987813750949	(01)14987813706370
ピオグリタゾン錠30mg「タナベ」	100錠 (10錠×10)PTP	4 987813 706403	(01)04987813750956	(01)14987813706400
ピオグリタゾン錠30mg「タナベ」	140錠 (14錠×10)PTP	4 987813 706410	(01)04987813751045	(01)14987813706417
ピオグリタゾン錠30mg「タナベ」	500錠 (10錠×50)PTP	4 987813 706427	(01)04987813750956	(01)14987813706424
ピオグリタゾン錠30mg「タナベ」	500錠　バラ	4 987813 706434	(01)04987813751052	(01)14987813706431
リセドロン酸Na塩錠2.5mg「タナベ」	100錠 (10錠×10)PTP	4 987813 706281	(01)04987813750598	(01)14987813706288
リセドロン酸Na塩錠2.5mg「タナベ」	140錠 (14錠×10)PTP	4 987813 706298	(01)04987813750628	(01)14987813706295
ソラネキノンカプセル5mg	100カプセル (10カプセル×10)PTP	4 987813 706465	(01)04987813751069	(01)14987813706462
ビフォルベリン錠20mg	100錠 (10錠×10)PTP	4 987813 706472	(01)04987813751076	(01)14987813706479
ジルチアゼム塩酸塩錠60mg「CH」	100錠 (10錠×10)PTP	4 987813 706489	(01)04987813751083	(01)14987813706486

バーコード一覧

品　名	包　装	JANコード	GS1-RSSコード	
			調剤包装単位	販売包装単位
カルメゾシン錠0.5mg	100錠 (10錠×10)PTP	4 987813 706496	(01)04987813751090	(01)14987813706493
カルメゾシン錠4mg	100錠 (10錠×10)PTP	4 987813 706502	(01)04987813754015	(01)14987813706509
リスペリドン錠3mg 「CH」	100錠 (10錠×10)PTP	4 987813 706519	(01)04987813754022	(01)14987813706516
アセトアミノフェン坐剤 小児用50mg「タナベ」	100個(5個×20)	4 987813 706526		(01)14987813706523
アセトアミノフェン坐剤 小児用100mg「タナベ」	100個(5個×20)	4 987813 706533		(01)14987813706530
アセトアミノフェン坐剤 小児用200mg「タナベ」	100個(5個×20)	4 987813 706540		(01)14987813706547

個装箱サイズ／体積一覧

品　名	包　装	個装箱サイズ（mm）	体積（mL）
ピオグリタゾン錠15mg「タナベ」	100錠（10錠×10）PTP	45×105×35	165
ピオグリタゾン錠15mg「タナベ」	140錠（14錠×10）PTP	50×140×35	245
ピオグリタゾン錠15mg「タナベ」	500錠（10錠×50）PTP	45×120×100	540
ピオグリタゾン錠15mg「タナベ」	500錠　バラ	51×52×95	252
ピオグリタゾン錠30mg「タナベ」	100錠（10錠×10）PTP	45×105×35	165
ピオグリタゾン錠30mg「タナベ」	140錠（14錠×10）PTP	50×140×35	245
ピオグリタゾン錠30mg「タナベ」	500錠（10錠×50）PTP	45×120×100	540
ピオグリタゾン錠30mg「タナベ」	500錠　バラ	51×52×95	252
リセドロン酸Na塩錠2.5mg「タナベ」	100錠（10錠×10）PTP	46×115×38	201
リセドロン酸Na塩錠2.5mg「タナベ」	140錠（14錠×10）PTP	46×140×38	245
ソラネキノンカプセル5mg	100カプセル（10カプセル×10）PTP	58×115×45	300
ビフォルベリン錠20mg	100錠（10錠×10）PTP	50×105×35	184
ジルチアゼム塩酸塩錠60mg「CH」	100錠（10錠×10）PTP	48×125×35	210
カルメゾシン錠0.5mg	100錠（10錠×10）PTP	50×105×35	184
カルメゾシン錠4mg	100錠（10錠×10）PTP	50×105×35	184
リスペリドン錠3mg「CH」	100錠（10錠×10）PTP	45×120×35	189
アセトアミノフェン坐剤小児用50mg「タナベ」	100個（5個×20）	97×97×60	565
アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「タナベ」	100個（5個×20）	99×114×64	722
アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「タナベ」	100個（5個×20）	110×114×64	803

製品に関するお問合せ先　**受付時間 9:00～17:30**（土、日、祝日、その他弊社休業日を除く）

田辺三菱製薬※1

田辺三菱製薬株式会社

くすり相談センター

電話 0120-507-319

長生堂製薬※2

<文献請求、副作用、学術情報に関するお問合せ>

長生堂製薬株式会社　安全管理本部

医薬情報部

電話 0120-965-200

<左記以外に関するお問合せ>

長生堂製薬株式会社

薬事管理課

電話 0120-958-500

田辺製薬販売株式会社 ホームページアドレス

http://www.tanabe.co.jp/

田辺製薬販売　ウェブ検索

田辺製薬販売株式会社

大阪市中央区北浜2-6-18

田辺三菱製薬グループ

2GE--402A-

2011年3月作成