



患者さん用説明書 変更のご案内

2017 年 8 月

経皮吸収型・心疾患治療剤

ジドレン[®]テープ[°]27mg

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
このたび、「ジドレンテープ27mg」の患者さん用説明書の内容を変更いたしますのでご案内申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹 白

I. 変更ロット及び出荷時期

販売名	包 装	統一商品コード	従来品 最終ロット	変更品		出荷時期 ^{注)}
				初回ロット	使用期限	
ジドレンテープ27mg	140枚(1枚×140)	813-701620	WF0442	WF0451	2019年5月	2017年10月

注) 特約店への出荷予定時期を表します。
流通状況により出荷予定時期が前後することもあるかと存じますが、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

II. 変更内容

裏面の「患者さん用説明書」(見本)をご参照願います。


(裏面へ続く)

患者さんへ

ジドレンテープ27mg (DYDRENE TAPE 27mg) の使い方

貼る場所

医師又は薬剤師の指示に従って胸、腰、上腕のいずれかに貼ってください。
貼る場所が汗・脂等でぬれている時は、よく拭きとってから使用してください。




薬を貼る場所

必ず上の図のいずれかの場所に貼ってください

- 自動体外式除細動器 (AED) の電極パッドの貼付部位は「右鎖骨すぐ下」と「左脇下の肋骨最下部」です。
本剤を貼る際は、AEDの妨げとならないよう、必ず上の図の場所に貼ってください。

裏面もお読みください

貼り方



- ① 四角の透明シールにスリットを入れてありますので、それを上にして二つに折ってください。
- ② シールの一方をはがして、テープの粘着面を皮膚に貼り付けてください。
- ③ もう一方のシールも同様にはがし、皮膚に貼ってください。(テープにしわが寄らないように十分注意して貼ってください。)

その他の注意

- 傷口、発赤、発疹、かぶれ等のある場所及び胸毛の部分には貼らないで下さい。
- 新しい薬に貼り替えるときは、前回と異なる場所に貼ってください。
- 薬を貼っているときには勃起不全治療剤 (バイアグラ錠、レバチオ錠、レビトラ錠、シアリス錠) や、アドシルカ錠などは絶対に服用しないでください。
- 小児の手の届かないところに保管してください。
- ご使用になるまでは、開封しないで、高温を避けて保管してください。

2012年2月改訂(C-4)


患者さんへ

ジドレンテープ27mg (DYDRENE TAPE 27mg) の使い方

このテープは狭心症の薬です。医師の指示に従って、正しく使用してください。

貼る場所

胸、腰、上腕のいずれかに貼ってください。
貼る場所が汗・脂等でぬれている時は、よく拭きとってから使用してください。



薬を貼る場所

必ず上の図のいずれかの場所に貼ってください

- 自動体外式除細動器 (AED) の電極パッドの貼付部位は「右鎖骨すぐ下」と「左脇下の肋骨最下部」です。
本剤を貼る際は、AEDの妨げとならないよう、必ず上の図の場所に貼ってください。

裏面もお読みください

貼り方



- ① 四角の透明シールにスリットを入れてありますので、それを上にして二つに折ってください。
- ② シールの一方をはがして、テープの粘着面を皮膚に貼り付けてください。
- ③ もう一方のシールも同様にはがし、皮膚に貼ってください。(テープにしわが寄らないように十分注意して貼ってください。)

その他の注意

- 傷口、発赤、発疹、かぶれ等のある場所及び胸毛の部分には貼らないでください。
- 新しい薬に貼り替えるときは、前回と異なる場所に貼ってください。
- 薬を貼っているときには勃起不全治療剤 (バイアグラ錠、レビトラ錠、シアリス錠など) や、レバチオ錠、アドシルカ錠、ザルティア錠、アデムバス錠などは絶対に服用しないでください。
- 小児の手の届かないところに保管してください。
- ご使用になるまでは、開封しないで、高温を避けて保管してください。

2017年1月改訂(C-5)

(赤線部分修正)



販売

田辺製薬販売株式会社

大阪市中央区道修町3-2-10

http://www.tanabe.co.jp/