

医療関係者各位

**アスベリン<sup>®</sup>錠10、アスベリン<sup>®</sup>錠20、  
アスベリン<sup>®</sup>散10%、アスベリン<sup>®</sup>ドライシロップ2%、  
アスベリン<sup>®</sup>シロップ0.5% および アスベリン<sup>®</sup>シロップ「調剤用」2%**  
の過量服用ならびに処方誤り、調剤誤りの注意のお願い

2020年1月  
ニプロESファーマ株式会社

謹啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ニプロESファーマ株式会社の上記「アスベリン製剤（一般名：チペピジンヒベンズ酸塩）：鎮咳剤」につきましては、過量服用ならびに処方誤り、調剤誤りの事例報告が年 20～30 件程度報告されております。

過量服用や処方・調剤誤りは健康被害を引き起こすリスクがあります。「アスベリン製剤」を処方・調剤いただく際には、今一度、添付文書の用法・用量をご確認いただき、用量が最大量を超えないようご配慮賜りますようお願い申し上げます。

また、特に小児の患者様が1回分を適正に服用されるべくご指導いただきますようお願い申し上げます。  
謹白

事例1	シロップを子供が勝手に1日分(3回分)を1回で服用してしまった(3倍量)。
事例2	アスベリン散で0.15gのところ、1.5gで処方がきて、そのまま出してしまった(10倍量)。
事例3	アスベリンドライシロップ2%と間違えてアスベリン散10%を調剤してしまった(5倍量)。

【用法・用量】 (1日量剤形換算、1日3回投与)

剤形	1歳未満	1歳以上3歳未満	3歳以上6歳未満	成人
錠10	—	—	—	6～12錠
錠20	—	—	—	3～6錠
散10%	0.05～0.2g	0.1～0.25g	0.15～0.4g	0.6～1.2g
ドライシロップ2%	0.25～1g	0.5～1.25g	0.75～2g	3～6g
シロップ0.5%	1～4mL	2～5mL	3～8mL	12～24mL
シロップ「調剤用」2%	0.25～1mL	0.5～1.25mL	0.75～2mL	3～6mL

本件についてのお問い合わせ先：

販売名	<b>アスベリン<sup>®</sup>錠10</b>	<b>アスベリン<sup>®</sup>錠20</b>	<b>アスベリン<sup>®</sup>散10%</b>
製剤の写真			
販売名	<b>アスベリン<sup>®</sup> ドライシロップ 2%</b>	<b>アスベリン<sup>®</sup> シロップ 0.5%</b>	<b>アスベリン<sup>®</sup> シロップ「調剤用」2%</b>
製剤の写真			
問い合わせ先	<p>ニプロ株式会社 医薬品情報室</p> <p>TEL:0120-226-898</p> <p>受付時間 9時 ~ 17時15分 (土、日、祝日、その他弊社休業日を除く)</p>		