

新発売のご案内

H₂受容体拮抗剤

日本薬局方 ニザチジンカプセル

ニザチジンカプセル 75mg「タナベ」 ニザチジンカプセル 150mg「タナベ」

NIZATIDINE Capsules 75mg・Capsules 150mg

指定医薬品

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、下記のとおりH₂受容体拮抗剤『ニザチジンカプセル75mg「タナベ」、ニザチジンカプセル150mg「タナベ」』を新発売いたしましたので、ご案内申し上げます。

謹白

製品に関するお問合せ先

田辺三菱製薬株式会社
くすり相談センター 電話 0120-507-319
(弊社営業日の 9:00 ~ 17:30)



記

■発 売 日:2008年7月8日

■発 売 名:ニザチジンカプセル75mg「タナベ」、ニザチジンカプセル150mg「タナベ」

■ 効能・効果

ニザチジンカプセル75mg「タナベ」：胃潰瘍、十二指腸潰瘍、逆流性食道炎

下記疾患の胃粘膜病変（びらん、出血、発赤、浮腫）の改善

急性胃炎、慢性胃炎の急性増悪期

ニザチジンカプセル150mg「タナベ」：胃潰瘍、十二指腸潰瘍、逆流性食道炎

■ 用法・用量

胃潰瘍、十二指腸潰瘍

通常、成人にはニザチジンとして1回150mg を1日2回（朝食後、就寝前）経口投与する。

また1回 300mg を1日1回（就寝前）経口投与することもできる。なお、年齢、症状により適宜増減する。

逆流性食道炎

通常、成人にはニザチジンとして1回150mg を1日2回（朝食後、就寝前）経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

下記疾患の胃粘膜病変（びらん、出血、発赤、浮腫）の改善

急性胃炎、慢性胃炎の急性増悪期

通常、成人にはニザチジンとして1回75mg を1日2回（朝食後、就寝前）経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

〈用法・用量に関連する使用上の注意〉
本剤は腎排泄が主であるため、腎機能障害患者に 150mg を経口投与した場合、腎機能低下にともなう血漿中半減期の遅延と、血漿クリアランスの低下がみられた。

■ 包装・薬価等

品名	包装	薬価基準	包装薬価	薬価基準収載医薬品コード
ニザチジンカプセル75mg「タナベ」	100カプセル(10カプセル×10)PTP	14.10円	1,410円	2325005M2088
ニザチジンカプセル 150mg「タナベ」	100カプセル(10カプセル×10)PTP	16.50円	1,650円	2325005M1120

■ 規制区分

指定医薬品

■ 貯 法

室温保存（開封後は光及び湿気を避けて保存）

■ 使用期限

ニザチジンカプセル 75mg「タナベ」：3年

ニザチジンカプセル 150mg「タナベ」：3年

（外箱及びラベルに表示の使用期限内に使用すること）

■ 統一商品コード・JANコード

品名	包装	統一商品コード	JANコード	個装箱 (販売包装単位GS1-RSS)
ニザチジンカプセル75mg「タナベ」	100カプセル(10カプセル×10)PTP	813700548		
ニザチジンカプセル150mg「タナベ」	100カプセル(10カプセル×10)PTP	813700586		

■ 個装箱等物流情報

品名	包装	重量 (g)	寸法 (mm)
ニザチジンカプセル75mg「タナベ」	100カプセル(10カプセル×10)PTP	50	60×45×100
ニザチジンカプセル150mg「タナベ」	100カプセル(10カプセル×10)PTP	60	60×45×100

■ 梱包箱等物流情報

品名	包装	包装単位	重量 (kg)	寸法 (mm)
ニザチジンカプセル75mg「タナベ」	100カプセル(10カプセル×10)PTP	60	3.31	466×210×192
ニザチジンカプセル150mg「タナベ」	100カプセル(10カプセル×10)PTP	60	3.92	466×210×192

■ 製造販売

販 売：田辺製薬販売株式会社

製造販売元：田辺三菱製薬株式会社



販売
田辺製薬販売株式会社
大阪市中央区平野町3-2-8
http://www.tanabe.co.jp/



製造販売元
田辺三菱製薬株式会社
大阪市中央区道修町3-2-10