

【効能・効果】、【用法・用量】の一部変更承認取得のご案内

抗血小板剤

日本薬局方 クロピドグレル硫酸塩錠

クロピドグレル錠 ^{25mg}_{50mg}_{75mg}「タナベ」

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、皆様にお引き立ていただいております弊社製品、抗血小板剤『クロピドグレル錠25mg「タナベ」・同50mg「タナベ」・同75mg「タナベ」』の【効能・効果】及び【用法・用量】につきまして、「経皮的冠動脈形成術(PCI)が適用される虚血性心疾患」に係る承認事項の一部変更承認を取得しました(平成27年10月28日付)。ここに謹んでご案内申し上げます。

なお、当変更に伴い【使用上の注意】等が変更となりますので、それら詳細につきましては、別途、添付文書改訂のお知らせとしてご案内させていただきます。

今後とも弊社製品に変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹 白

2015年10月

■【効能・効果】・【用法・用量】の一部変更承認に基づく改訂

改訂後(下線 部:追記改訂箇所)	改訂前
<p>【効能・効果】 虚血性脳血管障害(心原性脳塞栓症を除く)後の再発抑制 <u>経皮的冠動脈形成術(PCI)が適用される下記の虚血性心疾患</u> 急性冠症候群(不安定狭心症、非ST上昇心筋梗塞、ST上昇心筋梗塞) 安定狭心症、陳旧性心筋梗塞</p> <p>【用法・用量】 <u>虚血性脳血管障害(心原性脳塞栓症を除く)後の再発抑制の場合</u> 通常、成人には、クロピドグレルとして75mgを1日1回経口投与するが、年齢、体重、症状によりクロピドグレルとして50mgを1日1回経口投与する。 <u>経皮的冠動脈形成術(PCI)が適用される虚血性心疾患の場合</u> 通常、成人には、投与開始日にクロピドグレルとして300mgを1日1回経口投与し、その後、維持量として1日1回75mgを経口投与する。</p>	<p>【効能・効果】 虚血性脳血管障害(心原性脳塞栓症を除く)後の再発抑制</p> <p>【用法・用量】 通常、成人には、クロピドグレルとして75mgを1日1回経口投与するが、年齢、体重、症状によりクロピドグレルとして50mgを1日1回経口投与する。</p>

以上

■ 製品に関するお問合せ先：田辺三菱製薬株式会社 くすり相談センター ☎0120-507-319 (田辺製薬販売株式会社取扱い品窓口)
受付時間：9:00～17:30(土・日・祝日・その他弊社休業日を除く)



販売
田辺製薬販売株式会社
大阪市中央区道修町3-2-10



製造販売元
田辺三菱製薬株式会社
大阪市中央区道修町3-2-10