

ドネペジル塩酸塩内用液 3mg 「タナベ」
ドネペジル塩酸塩内用液 5mg 「タナベ」
ドネペジル塩酸塩内用液 10mg 「タナベ」

【この薬は？】

販売名	ドネペジル塩酸塩 内用液 3mg 「タナベ」 DONEPEZIL Hydrochloride Oral Solution 3mg	ドネペジル塩酸塩 内用液 5mg 「タナベ」 DONEPEZIL Hydrochloride Oral Solution 5mg	ドネペジル塩酸塩 内用液 10mg 「タナベ」 DONEPEZIL Hydrochloride Oral Solution 10mg
一般名	ドネペジル塩酸塩 Donepezil Hydrochloride		
含有量 (1包中)	3mg	5mg	10mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するとき特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、「医薬品医療機器情報提供ホームページ」
<http://www.info.pmda.go.jp/>に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症治療剤の中の、コリンエステラーゼ阻害剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、脳内の神経伝達物質であるアセチルコリンを分解する酵素の働きを抑えることにより、認知症の症状が進むのを遅らせます。
- ・次の目的で処方されます。

アルツハイマー型認知症及びレビー小体型認知症における認知症症状の進行抑制

- ・この薬は、体調がよくなったと判断して使用を中止したり、量を減らしたりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに使用し続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- 次の人は、この薬を使用することはできません。
 - ・過去にドネペジル塩酸塩「タナベ」に含まれる成分やピペリジン誘導体に対して過敏な反応を経験したことがある人
- 次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。
 - ・洞不全症候群または伝導障害など、心臓に障害のある人
 - ・消化性潰瘍を過去に経験したことがある人、非ステロイド性消炎鎮痛剤を使用している人
 - ・気管支喘息や閉塞性肺疾患を過去に経験したことがある人
 - ・錐体外路障害（パーキンソン病、パーキンソン症候群など）のある人
- この薬には併用を注意すべき薬（非ステロイド性消炎鎮痛剤など）があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

	開始時	開始後 1～2 週間後
1 回量	3mg	5mg
回数	1 日 1 回	

高度のアルツハイマー型認知症およびレビー小体型認知症には、5 mgで4週間以上経過後、10 mgに増量します。

●どのように飲むか？

- ・開封後はすぐに全量を飲んでください。
- ・包装ごと飲まないようにしてください。

●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。

気がついた時に、1回分をできるだけ早く飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

嘔気、嘔吐（おうと）、流涎（りゅうぜん）（よだれがでる）、発汗、徐脈、低血圧、呼吸抑制、虚脱（力がぬける）、けいれん及び縮瞳（しゅくどう）、筋脱力などがあらわれる可能性があります。このような症状があらわれた場合は、ただちに医師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・不整脈*があらわれることがあります。特に心臓病（心筋梗塞、弁膜症、心筋症など）の人や電解質異常（低カリウム血症等）のある人では注意してください。異常を感じたら、ただちに受診してください。

*不整脈：

副作用は？の表中に示している QT 延長、心室頻拍、トルサード・ド・ポアント、心室細動、洞不全症候群、洞停止、高度徐脈、心ブロックをさします。

- ・この薬で、意識障害（気を失う、意識の低下など）、めまい、眠気などがあらわれることがあります。またアルツハイマー型認知症およびレビー小体型認知症でも自動車の運転等の機械操作能力が低下することがありますので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作はしないよう注意してください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳中の方は、授乳を避けてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

【レビー小体型認知症の人の場合】

- ・日常生活動作が制限される錐体外路障害や、薬で治療が必要な錐体外路障害がある場合、この薬の使用により、錐体外路障害が悪化しやすい傾向がみられています。異常を感じたら医師に相談してください。

副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
QT 延長 キューティーえんちょう	動悸、気を失う
心室頻拍 しんしつひんぱく	息切れ、動悸、脈が速くなる
トルサード・ド・ポアント	意識がなくなる、胸の痛み、胸部異和感、動悸、脈が速くなる、気を失う
心室細動 しんしつさいどう	めまい、目の前が暗くなる、胸の痛み、胸の不快感、動悸
洞不全症候群 どうふぜんしょうこうぐん	めまい、胸の痛み、息切れ、脈が遅くなる
洞停止 どうていし	めまい、心臓が止まる、気を失う
高度徐脈 こうどじょみやく	めまい、意識の低下、考えがまとまらない、息切れ、脈がとぶ、脈が遅くなる、判断力の低下
心ブロック しんぶろく	めまい、気を失う
失神 しっしん	気を失う
心筋梗塞 しんきんこうそく	冷や汗、急激に胸を強く押さえつけられた感じ、狭心痛、息苦しい
心不全 しんふぜん	からだがだるい、全身のむくみ、横になるより座っている時に呼吸が楽になる、息苦しい、息切れ、動く時の動悸




重大な副作用	主な自覚症状
消化性潰瘍 しょうかせいかいよう	腹痛、胃もたれ、背中の痛み
十二指腸潰瘍穿孔 じゅうにしちょうかいようせんこう	激しい腹痛、吐き気、嘔吐、冷や汗
消化管出血 しょうかかんしゅっけつ	血を吐く、嘔吐、吐き気、腹痛、血が混ざった便、黒色便
肝炎、肝機能障害、黄疸 かんえん、かんきのうしょうがい、おうだん	からだがだるい、白目が黄色くなる、吐き気、嘔吐、食欲不振、皮膚が黄色くなる、かゆみ、尿が黄色い
脳性発作 のうせいほっさ	意識の低下、考えがまとまらない、けいれん、判断力の低下
脳出血 のうしゅっけつ	片側のまひ、意識の低下、考えがまとまらない、頭痛、しゃべりにくい、吐き気、嘔吐、手足のまひ、しびれ、半身不随、意識を失って深く眠りこむ、判断力の低下
脳血管障害 のうけっかんしょうがい	めまい、意識がうすれる、考えがまとまらない、頭痛、嘔吐、半身まひ、しゃべりにくい、判断力の低下
錐体外路障害 すいたいがいろうしょうがい	動きが遅い、眼球が上を向く、首のねじれやつっぱり、手足のふるえやこわばり、筋肉のこわばり
悪性症候群 あくせいしょうこうぐん	38℃以上の発熱、ふるえ、意識がうすれる、考えがまとまらない、判断力が低下する、飲み込みにくい、筋肉のこわばり
横紋筋融解症 おうもんきんゆうかいしょう	脱力感、手のしびれ、手足のこわばり、足のしびれ、筋肉の痛み、赤褐色尿
呼吸困難 こきゅうこんなん	息苦しい、息切れ
急性腓炎 きゅうせいすいえん	発熱、吐き気、嘔吐、急に激しくおなかが痛む、急に激しく腰や背中が痛む
急性腎障害 きゅうせいじんしょうがい	からだがだるい、からだのむくみ、疲れやすい、意識の低下、頭痛、眼がはれぼったい、息苦しい、尿がでない、尿量が減る
原因不明の突然死 げんいんふめいのとつぜんし	突然死
血小板減少 けっしょうばんげんしょう	鼻血、歯ぐきの出血、あおあざができる、皮下出血、出血が止まりにくい

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	からだがだるい、全身のむくみ、からだのむくみ、疲れやすい、脱力感、発熱、38℃以上の発熱、動きが遅い、半身まひ、片側のまひ、しびれ、半身不随、冷や汗、ふるえ、急に激しく腰や背中が痛む、背中の痛み、めまい

部位	自覚症状
頭部	頭痛
眼	白目が黄色くなる、眼球が上を向く、眼がはれぼったい、眼の前が暗くなる
口や喉	しゃべりにくい、飲み込みにくい、歯ぐきの出血
胸部	吐き気、嘔吐、胸の痛み、胸部異和感、胸の不快感、急激に胸を強く押さえつけられた感じ、狭心痛、息苦しい、胃もたれ
腹部	腹痛、激しい腹痛、急に激しくおなかが痛む、食欲不振
手・足	手足のまひ、手足のこわばり、手足のふるえやこわばり、手のしびれ、足のしびれ
皮膚	かゆみ、皮膚が黄色くなる、皮下出血
筋肉	筋肉の痛み、筋肉のこわばり、首のねじれやつっぱり、けいれん
尿	尿が黄色い、尿がでない、尿量が減る、赤褐色尿
その他	意識がなくなる、意識の低下、考えがまとまらない、判断力の低下、意識がうすれる、意識を失って深く眠りこむ、動悸、気を失う、息切れ、横になるより座っている時に呼吸が楽になる、動く時の動悸、脈が速くなる、脈が遅くなる、脈がとぶ、血を吐く、鼻血、あおあざができる、出血が止まりにくい、血が混ざった便、黒色便、突然死、心臓が止まる、

【この薬の形は？】

販売名	ドネペジル塩酸塩 内用液 3mg 「タナベ」 DONEPEZIL Hydrochloride Oral Solution 3mg	ドネペジル塩酸塩 内用液 5mg 「タナベ」 DONEPEZIL Hydrochloride Oral Solution 5mg	ドネペジル塩酸塩 内用液 10mg 「タナベ」 DONEPEZIL Hydrochloride Oral Solution 10mg
外形 (容器の形状)			
性状	無色澄明の液		
識別コード	なし	なし	なし

【この薬に含まれているのは？】

販売名	ドネペジル塩酸塩 内用液 3mg 「タナベ」 DONEPEZIL Hydrochloride Oral Solution 3mg	ドネペジル塩酸塩 内用液 5mg 「タナベ」 DONEPEZIL Hydrochloride Oral Solution 5mg	ドネペジル塩酸塩 内用液 10mg 「タナベ」 DONEPEZIL Hydrochloride Oral Solution 10mg
有効成分	ドネペジル塩酸塩		

添加物	リン酸二水素ナトリウム, D-ソルビトール液, プロピレングリコール, エデト酸カルシウム二ナトリウム水和物, スクラロース, メチルパラベン, プロピルパラベン, 香料, リン酸, 水酸化ナトリウム
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・誤用を避けるため他の容器に移し替えて保管しないでください。
- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。

- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

販売会社：ニプロ ES ファーマ株式会社

(<https://www.nipro-es-pharma.co.jp>)

製造販売会社：ニプロ ES ファーマ株式会社

(<https://www.nipro-es-pharma.co.jp>)

ニプロ株式会社 医薬品情報室

電話：0120 -226 -898

受付時間：9時～ 17時 15分

(土、日、祝日、その他弊社休業日を除く)