

リルゾール錠 50mg 「タナベ」

【この薬は？】

販売名	リルゾール錠 50mg 「タナベ」 RILUZOLE Tablets 50mg
一般名	リルゾール Riluzole
含有量 (1 錠中)	50mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、筋萎縮性側索硬化症用剤と呼ばれる薬です。
- ・この薬は、神経細胞を保護して、筋力の低下や食べ物が飲み込みにくくなるなどの病気の進行を抑える薬です。症状を改善させたり、軽減したりする働きはありません。
- ・次の目的で処方されます。

筋萎縮性側索硬化症（ALS）の治療

筋萎縮性側索硬化症（ALS）の病勢進展の抑制

- ・この薬は、増量しても効果の増強は期待できず、また副作用の頻度および程度が増大するおそれがあるので、指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・肝臓に重篤な障害のある人
- ・過去にリルゾール錠「タナベ」やリルゾール錠「タナベ」に含まれる成分で過敏症のあった人
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人

○次の人は、特に注意が必要です。使用する前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・発熱があり、感染症にかかっている疑いのある人
- ・腎臓に障害がある人
- ・過去に肝臓に肝機能異常のあった人または肝臓に異常のある人（肝臓に重篤な障害がある人を除く）
- ・授乳中の人

○この薬は、使用前に血液検査が行われることがあります。

○この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

使用量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人の飲む量および回数は、1日2回1回1錠を朝および夕食前に飲みます。

●どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。

気がついた時に、1回分を飲んでください。ただし、次の通常飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

誤って多く飲んだ場合、昏迷（無言、無表情、無意志）、昏睡（意識の消失、刺激に全く反応しない）などの症状があらわれることがあります。いくつかの症状が同じような時期にあらわれた場合は、ただちに医師に連絡してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・有効性や副作用について、患者さんまたは保護者の方は、十分に理解できるまで説明を受けてください。
- ・この薬は、使用中に定期的な血液検査が行われることがあります。
- ・服用量を増やしても効果が強くなることは期待できません。副作用が増大するおそれもありますので、決められた用量を守ってください。
- ・眠くなったり、めまいが起こることがあるので、車の運転や危険を伴う機械の操作などは避けてください。
- ・妊娠または妊娠している可能性のある人はこの薬を使用することはできません。
- ・授乳している人は医師に相談してください。

- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
アナフィラキシー	全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸（どうき）、息苦しい
好中球減少 こうちゅうきゅうげんしょう	突然の高熱、喉の痛み、寒気
間質性肺炎 かんしつせいはいえん	咳、息切れ、息苦しい、発熱
肝機能障害 かんきのうしょうがい	疲れやすい、体がだるい、力が入らない、吐き気、食欲不振
黄疸 おうだん	白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる、体がかゆくなる

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	発熱、ふらつき、突然の高熱、寒気、体がかゆくなる、体がだるい、疲れやすい、力が入らない
眼	白目が黄色くなる
口や喉	咳、喉のかゆみ、喉の痛み、吐き気
胸部	息切れ、息苦しい、動悸
腹部	食欲不振
皮膚	全身のかゆみ、じんま疹、皮膚が黄色くなる
尿	尿の色が濃くなる

【この薬の形は？】

PTP シート	
形状	長円形のフィルムコーティング錠 
長径	10.1mm
短径	5.1mm
厚さ	3.2mm
重さ	185mg
色	淡黄白色～淡黄色
識別コード	TS95

【この薬に含まれているのは？】

有効成分	リルゾール
添加剤	無水リン酸水素カルシウム，結晶セルロース，クロスカルメロースナトリウム，軽質無水ケイ酸，ステアリン酸マグネシウム，ヒプロメロース，マクロゴール 6000，酸化チタン，黄色三二酸化鉄

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

販 売 会 社：ニプロ ES ファーマ株式会社
(<http://www.nipro-es-pharma.co.jp>)

製造販売会社：ニプロ ES ファーマ株式会社
(<http://www.nipro-es-pharma.co.jp>)

ニプロ株式会社 医薬品情報室

電話：0120 -226 -898

受付時間：9 時～ 17 時 15 分

(土、日、祝日、その他弊社休業日を除く)