



日本標準商品分類番号
87449

ロイコトリエン受容体拮抗剤
気管支喘息治療剤

**日本薬局方 モンテルカストナトリウム顆粒

モンテルカスト細粒 4mg「タナベ」

MONTELUKAST Fine granules 4mg

貯法：室温保存
使用期限：外箱及び分包に表示の使用期限内に使用すること

承認番号	22900AMX00345
* 薬価収載	2017年6月
* 販売開始	2017年6月

【禁忌】(次の患者には投与しないこと)

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

【組成・性状】

有効成分 (1包0.5g中)	日局 モンテルカストナトリウム 4.16mg (モンテルカストとして4mg)
添加物	D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセル ロース、ステアリン酸マグネシウム
性状・剤形	白色・細粒

【効能・効果】

気管支喘息

【用法・用量】

通常、1歳以上6歳未満の小児にはモンテルカストとして4mg(本剤1包)を1日1回就寝前に経口投与する。

【用法・用量に関連する使用上の注意】

1. 体重、年齢、症状等による用量調節をせず、全量を服用すること。
2. 光に不安定であるため、開封後直ちに(15分以内に)服用すること。(「適用上の注意」の項参照)

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1)本剤は、喘息の悪化時ばかりでなく、喘息が良好にコントロールされている場合でも継続して服用するよう、患者、保護者又はそれに代わり得る適切な者に十分説明しておくこと。
- (2)本剤は気管支拡張剤、ステロイド剤等と異なり、すでに起こっている喘息発作を緩解する薬剤ではないので、このことは患者、保護者又はそれに代わり得る適切な者に十分説明しておく必要がある。
- (3)気管支喘息患者に本剤を投与中、大発作をみた場合は、気管支拡張剤あるいはステロイド剤を投与する必要がある。
- (4)長期ステロイド療法を受けている患者で、本剤投与によりステロイドの減量をはかる場合は十分な管理下で徐々に行うこと。
- (5)本剤投与によりステロイド維持量を減量し得た患者で、本剤の投与を中止する場合は、原疾患再発のおそれがあるので注意すること。
- (6)モンテルカスト製剤との因果関係は明らかではないが、うつ病、自殺念慮、自殺及び攻撃的行動を含む精神症状が報告されているので、患者の状態を十分に観察すること。(「その他の注意」の項参照)
- (7)モンテルカスト製剤を含めロイコトリエン拮抗剤使用時にChurg-Strauss症候群様の血管炎を

生じたとの報告がある。これらの症状は、おおむね経口ステロイド剤の減量・中止時に生じている。本剤使用時は、特に好酸球数の推移及びしびれ、四肢脱力、発熱、関節痛、肺の浸潤影等の血管炎症状に注意すること。

(8)本剤投与により効果が認められない場合には、漫然と長期にわたり投与しないように注意すること。

(9)小児では一般に自覚症状を訴える能力が劣るので、本剤の投与に際しては、保護者等に対し、患者の状態を十分に観察し、異常が認められた場合には速やかに主治医に連絡する等の適切な処置をするように注意を与えること。

2. 相互作用

本剤は、主として薬物代謝酵素チトクロームP450(CYP)2C8/2C9及び3A4で代謝される。

併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
フェノバルビター ル	本剤の作用が減弱 するおそれがある。	フェノバルビター ルがCYP3A4を誘 導し、本剤の代謝 が促進される。

3. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1)重大な副作用(頻度不明)

- 1) **アナフィラキシー**：アナフィラキシーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には直ちに投与を中止し適切な処置を行うこと。
- 2) **血管浮腫**：血管浮腫があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には直ちに投与を中止し適切な処置を行うこと。
- 3) **劇症肝炎、肝炎、肝機能障害、黄疸**：劇症肝炎、肝炎、肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し適切な処置を行うこと。
- 4) **中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis：TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、多形紅斑**：中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し適切な処置を行うこと。
- 5) **血小板減少**：血小板減少(初期症状：紫斑、鼻出血、歯肉出血等の出血傾向)があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

(2)その他の副作用

次のような症状又は異常があらわれた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

頻度 種類	頻度不明
過敏症	皮疹, そう痒, 蕁麻疹, 肝臓の好酸球浸潤
精神神経系	頭痛, 傾眠, 情緒不安, 不眠, 幻覚, めまい, 感覚異常(しびれ等), 異夢, 易刺激性, 痙攣, 激越, 振戦, 夢遊症, 失見当識, 集中力低下, 記憶障害, せん妄
呼吸器	肺好酸球増多症
消化器系	下痢, 腹痛, 胃不快感, 嘔気, 胸やけ, 嘔吐, 便秘, 口内炎, 消化不良
肝臓	肝機能異常, AST(GOT)上昇, ALT(GPT)上昇, ALP上昇, γ -GTP上昇, 総ビリルビン上昇
筋骨格系	筋痙攣を含む筋痛, 関節痛
その他	口渇, 尿潜血, 血尿, 尿糖, 浮腫, 倦怠感, 白血球数増加, 尿蛋白, トリグリセリド上昇, 出血傾向(鼻出血, 紫斑等), 動悸, 頻尿, 発熱, 脱毛, 挫傷, 脱力, 疲労, 遺尿

4. 妊婦, 産婦, 授乳婦等への投与

- (1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には, 治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。〔妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。海外の市販後において, 妊娠中にモンテルカスト製剤を服用した患者から出生した新生児に先天性四肢奇形がみられたとの報告がある。これらの妊婦のほとんどは妊娠中, 他の喘息治療薬も服用していた。モンテルカスト製剤とこれらの事象の因果関係は明らかにされていない。〕
- (2) 授乳中の婦人に投与する場合は慎重に投与すること。〔動物実験(ラット)で乳汁中への移行が報告されている。〕
注: 本剤の承認用法・用量は, 1歳以上6歳未満小児に対してモンテルカストとして1日1回4mgである。

5. 小児等への投与

- (1) 6歳以上の小児に対しては, モンテルカストチュアブル錠5mgを1日1回就寝前に投与すること。
- (2) 1歳未満の乳児, 新生児, 低出生体重児に対するモンテルカスト製剤の安全性は確立していない。(国内でのモンテルカスト製剤の使用経験がない。)

6. 適用上の注意

- (1) 本剤は, 食事の有無にかかわらず投与できる。
- (2) 本剤は口に直接入れるか, スプーン1杯程度の柔らかい食物(室温以下)と混ぜて服用することができる。またスプーン1杯(約5mL)の調製ミルク又は母乳(室温以下)と混ぜて服用することもできる。本剤服用後は水などの飲み物を摂取してもよい。
- (3) 本剤は光に不安定であるため, 服用の準備ができるまで開封しないこと。柔らかい食物, 調製ミルク又は母乳と混ぜた場合も, 放置せずに直ちに(15分以内に)服用すること。
- (4) 本剤は光に不安定であるため, 再分包しないこと。

7. その他の注意

他社が実施したプラセボ対照臨床試験41試験を対象に統合解析を行った結果, モンテルカスト製剤投与群9,929例中1例において自殺念慮が認められたのに対して, プラセボ群7,780例において自殺念慮は認められなかった。

また, 他社が実施したプラセボ対照臨床試験46試験を対象に統合解析を行った結果, 行動変化に関連する事象(不眠, 易刺激性等)が, モンテルカスト製剤投与群11,673例中319例(2.73%), プラセボ群8,827例中200例(2.27%)において認められたが, 統計学的な有意差は認められなかった。


【薬物動態】

生物学的同等性試験

モンテルカスト細粒4mg「タナベ」と標準製剤を, クロスオーバー法によりそれぞれ1包(モンテルカストとして4mg)健康成人男子に絶食単回経口投与して血漿中モンテルカスト濃度を測定し, 得られた薬物動態パラメータ(AUC, Cmax)について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果, $\log(0.80) \sim \log(1.25)$ の範囲内であり, 両剤の生物学的同等性が確認された¹⁾。

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC ₀₋₂₄ (ng・hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	t _{1/2} (hr)
モンテルカスト 細粒4mg「タナベ」	1716 ± 369	259.177 ± 35.069	1.6 ± 0.3	5.53 ± 0.83
標準製剤 (細粒, 4mg)	1841 ± 403	267.231 ± 41.383	1.7 ± 0.6	5.40 ± 0.83

(Mean ± S.D., n = 20)



血漿中濃度並びにAUC, Cmax等のパラメータは, 被験者の選択, 体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

【薬効薬理】

抗アレルギー薬。アレルギーのメディエーターの1つであるロイコトリエン(LT)の受容体には, cysLT1受容体とcysLT2受容体があるが, 本薬はcysLT1受容体遮断薬であり, 気管支喘息やアレルギー性鼻炎に用いられる²⁾。

【有効成分に関する理化学的知見】


一般名: モンテルカストナトリウム
(Montelukast Sodium)

化学名: Monosodium (1- {[(1R)-1- {3- [(1E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl) ethenyl] phenyl} -3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl) phenyl] propyl] sulfanyl] methyl} cyclopropyl) acetate

分子式: C₃₅H₃₅ClNNaO₃S

分子量: 608.17

構造式:



性状：白色～微黄白色の粉末である。
メタノール及びエタノール(99.5)に極めて溶けやすく、水に溶けやすい。
吸湿性である。
光によって黄色に変化する。
結晶多形が認められる。

【取扱い上の注意】

安定性試験

最終包装品を用いた加速試験(40℃, 相対湿度75%, 6ヵ月)の結果, モンテルカスト細粒4mg「タナベ」は通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された³⁾。

【包装】

モンテルカスト細粒4mg「タナベ」：100包(10包×10),
14包(7包×2),
140包(7包×20)

【主要文献及び文献請求先】

1. 主要文献

- 1) モンテルカスト細粒の生物学的同等性に関わる資料(社内資料)
- 2) 第十七改正日本薬局方解説書, 廣川書店 2016 ; C-5593-C-5603
- 3) モンテルカスト細粒の安定性に関わる資料(社内資料)

* 2. 文献請求先

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求下さい。

ニプロ株式会社 医薬品情報室
〒531-8510 大阪市北区本庄西3丁目9番3号
TEL : 0120-226-898
FAX : 06-6375-0177



*

NIPRO

製造販売

ニプロESファーマ株式会社
大阪市北区本庄西3丁目9番3号