

ベポタスチンベシル酸塩 OD 錠 5mg 「タナベ」 ベポタスチンベシル酸塩 OD 錠 10mg 「タナベ」

【この薬は？】

販売名	ベポタスチンベシル酸塩 OD 錠 5mg 「タナベ」 BEPOTASTINE BESILATE OD Tab. 5mg	ベポタスチンベシル酸塩 OD 錠 10mg 「タナベ」 BEPOTASTINE BESILATE OD Tab. 10mg
一般名	ベポタスチンベシル酸塩 Bepotastine Besilate	
含有量 (1錠中)	5mg	10mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、アレルギー性疾患治療剤です。
- ・この薬は、アレルギーの原因となる物質（ヒスタミン）や炎症を起こす物質の作用を抑え、アレルギー症状を改善します。
- ・次の病気の人に処方されます。

<成人>

アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患に伴う痒痒（湿疹・皮膚炎、痒疹、皮膚痒痒症）

<小児>

アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患（湿疹・皮膚炎、皮膚痒痒症）に伴う痒痒

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- 次の人は、この薬を使用することはできません。
 - ・過去にベポタスチンベシル酸塩 OD 錠に含まれる成分で過敏な反応を経験したことがある人
- 次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。
 - ・腎臓に障害のある人
 - ・高齢の人

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、飲む量および回数は、次のとおりです。

販売名	ベポタスチンベシル酸塩 OD 錠 5mg「タナベ」	ベポタスチンベシル酸塩 OD 錠 10mg「タナベ」
一回量	2 錠	1 錠
飲む回数	1 日 2 回	1 日 2 回

●どのように飲むか？

この薬は、口の中で溶かして飲む薬です。舌の上で唾液を含ませ舌で軽くつぶして、唾液で飲み込みます。唾液だけでは飲み込めない場合は、コップ 1 杯程度の水またはぬるま湯で飲み込んでください。

この薬は寝たままの状態では水なしで飲まないでください。

●飲み忘れた場合の対応

決して 2 回分を一度に飲まないでください。気がついた時に、1 回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は 1 回とばして、次の時間に 1 回分飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・眠気があらわれることがあるので、この薬を飲んでいるときは車の運転等の危険を伴う機械の操作に気をつけてください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳を避けてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

【この薬の形は？】

販売名	ベポタスチンベシル酸塩 OD錠 5mg「タナベ」	ベポタスチンベシル酸塩 OD錠 10mg「タナベ」
形状	素錠（口腔内崩壊錠） 	素錠（口腔内崩壊錠） 
直径	7.0mm	9.5mm
厚さ	3.55mm	4.15mm
重さ	150mg	300mg
色	白色	

【この薬に含まれているのは？】

販売名	ベポタスチンベシル酸塩 OD錠 5mg「タナベ」	ベポタスチンベシル酸塩 OD錠 10mg「タナベ」
有効成分	ベポタスチンベシル酸塩	
添加物	D-マンニトール、ヒプロメロース酢酸エステルコハク酸エステル、クロスカルメロースナトリウム、二酸化ケイ素、アスパルテーム、フマル酸ステアリルナトリウム、L-メントール、ハッカ油	

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：ニプロ ES ファーマ株式会社

(<https://www.nipro-es-pharma.co.jp>)

ニプロ株式会社 医薬品情報室

電話：0120 -226 -898

受付時間：9時～ 17時 15分

（土、日、祝日、その他弊社休業日を除く）